

# DESPARAMENTAÇÃO

## LUVAS

1

- ✓ Segure o lado externo da luva com a mão enluvada e remova-a.
- ✓ Segure a luva removida com a mão enluvada.
- ✓ Introduza os dedos da mão não enluvada no punho da luva e remova-a de dentro para fora.
- ✓ Retire esta luva sobre a primeira luva e remova-a de dentro para fora.
- ✓ Descarte em uma lixeira infectante.



2

## CAPOTE OU AVENTAL

- ✓ Sua parte frontal e mangas estão contaminadas. Então, primeiro solte as tiras amarradas nas costas.
- ✓ Remova-o de dentro para fora, sem tocar em seu exterior.
- ✓ Após removê-lo, descarte-o em uma lixeira infectante.
- ✓ Higienize as mãos com água e sabão após a remoção.



3

## GORRO

- ✓ Deve ser retirado da testa para nuca, e descartado em uma lixeira infectante.
- ✓ Não encoste na parte de fora do gorro em nenhum momento.



4

## ÓCULOS DE PROTEÇÃO OU PROTETOR FACIAL

- ✓ O lado externo dos óculos de proteção ou protetor facial está contaminado.
- ✓ Para removê-los, segure pela lateral ou pelas hastes.
- ✓ A Limpeza e desinfecção devem ser realizadas de acordo com as instruções do fabricante.



## IMPORTANTE

- ✓ Exceto pela máscara, remova o EPI ainda no consultório.
- ✓ Os óculos e o protetor facial são de uso individual e não devem ser emprestados.
- ✓ A máscara PFF-2/N-95 ou similar poderá ser reutilizada conforme padronização da instituição.
- ✓ Após retirar os EPIs, higienize as mãos com água e sabão líquido ou álcool 70%.

5

## MÁSCARAS

- ✓ Não toque na área externa da máscara que está contaminada. Puxe apenas as alças inferiores, depois as alças superiores e remova.
- ✓ A máscara cirúrgica deverá ser descartada em uma lixeira infectante.

